



กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่ออันตราย


3 เก็บ 3 โรค

ป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

3 เก็บ



เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง
ให้ยุงลายวางไข่ได้



เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ
ภาชนะที่ปิดไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทิ้ง
หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ


ถ้าไม่ยากโดนยุงกัด ต้องป้องกันไม่ให้ยุงเกิด



4 ปัจจัยเสี่ยง

ผู้ใหญ่เสียชีวิต

โรคไข้เลือดออก



ร้อยละ **80**
มีโรคประจำตัว
หรืออ้วน



ร้อยละ **70**
ไปรักษาช้า
(ป่วยมากกว่า
2 วัน)



ร้อยละ **30**
ซื้อยาชุด
ไอบูโพรเฟน แอสไพริน
มากขึ้น



ร้อยละ **10**
ไม่เข้ารับการรักษา
หรือไม่มา
รักษาตามนัด

